

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA INTEGRADA EM MEDICINA VETERINÁRIA
ESCOLA DE VETERINÁRIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

ÁREA: Clínica Cirúrgica em Animais de Companhia

ENTRADA 2023

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTE

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 25 questões numeradas de 1 a 25, dispostas da seguinte maneira:
 - a. As questões de número 01 a 08 são relativas aos temas de Saúde Pública
 - b. As questões de 09 a 25 são específicas da área de concentração que você se inscreveu
2. Confira se o seu caderno de questões contém a quantidade de questões e se essas estão na ordem mencionada na instrução anterior. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente divergência, comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.
3. Assine o seu nome no espaço próprio do CARTÃO RESPOSTA, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
4. Não dobre, não amasse nem rasure o CARTÃO RESPOSTA, pois ele não poderá ser substituído.
5. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas quatro opções de resposta identificadas com as letras A, B, C, D. Apenas uma responde corretamente à questão.
6. No CARTÃO RESPOSTA preencha todo o espaço compreendido no círculo correspondente à opção escolhida. A marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
7. O tempo disponível para esta prova é de **duas horas e trinta minutos**.
8. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
9. Quando terminar a prova, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO RESPOSTA.
10. Você poderá deixar o local da prova somente após decorrido uma hora do início da aplicação. Poderá levar seu CADERNO DE QUESTÕES, ao deixar em definitivo a sala de provas nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova.
11. Você será excluído do exame no caso de:
 - a) prestar, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
 - b) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer participante ou pessoa envolvida no processo de aplicação das provas;
 - c) perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação da prova, incorrendo em comportamento indevido durante a realização do exame;
 - d) se comunicar, durante a prova, com outro participante verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma;
 - e) utilizar qualquer tipo de equipamento eletrônico e de comunicação durante a realização do exame;
 - f) utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento, em benefício próprio ou de terceiros, em qualquer etapa do exame;
 - g) estar trajando boné ou chapéu ou portar arma de fogo;
 - h) utilizar livros, notas ou impressos durante a realização do exame;
 - i) se ausentar da sala levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES antes do prazo estabelecido e / ou o CARTÃO RESPOSTA a qualquer tempo.

TEMAS DE SAÚDE PÚBLICA

QUESTÕES DE 01 A 08

QUESTÃO 01



No Brasil há um déficit sobre prevenção e tratamento dos casos de indivíduos em situação de acumulação, além de não haver destino correto para os animais, atualmente não há um protocolo nacional com os cuidados específicos para esta população pelo Sistema Único de Saúde. São necessárias ações municipais intersetoriais para a criação e funcionamento de um Programa de atenção aos indivíduos e também aos animais em situação de acumulação. Sobre essas ações, analise as afirmativas a seguir:

- I. Publicar um decreto, Instrução Normativa ou Nota Técnica, a fim de regulamentar e estimular a criação do Comitê de atendimento/acolhimento e acompanhamento de pessoas e animais em situação de acumulação,
- II. Criar uma gerência/diretoria de Defesa Animal, vinculada frequentemente à Secretaria Municipal de Saúde ou à de Meio Ambiente e que de forma conjunta a outras secretarias desempenhará ações importantes junto aos indivíduos em situação de acumulação e seus animais.
- III. Criar um comitê de trabalho intersetorial de atenção a situação de acumulação (CIASA) composto por profissionais de diferentes setores.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) I e III.
- d) I, II e III.

QUESTÃO 2



A correta destinação dos cadáveres de animais positivos ou com suspeita de esporotricose é imprescindível para evitar a contaminação ambiental pelo fungo. Dessa maneira, analise as recomendações em relação ao manejo do cadáver a seguir:

- I. Uso de EPI (uniforme, luvas e máscara) para manipulação do cadáver;
- II. Acondicionar o cadáver em saco branco leitoso com símbolo de risco biológico e identificar o saco devidamente.
- III. Caso seja necessário o transporte de cadáveres, realizá-lo por meio de caixas fechadas para evitar que as unhas do animal perfurem o saco.
- IV. Encaminhar ao aterro sanitário para enterrar em valas de resíduos da saúde, de preferência aqueles que sejam construídos dentro de normas preestabelecidas que garantam a qualidade do meio ambiente.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- a) I e II.
- b) II, III e IV.
- c) I, II e III.
- d) I e IV.

QUESTÃO 3



Observe a manchete de uma notícia, a seguir.

75% das doenças infecciosas emergentes que afetam o homem vieram de animais, diz brasileira que estuda relação entre epidemias e desmatamento das florestas

Disponível em: <https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/10/23/75percent-das-doencas-infecciosas-emergentes-que-afetam-o-homem-vieram-de-animais-diz-brasileira-que-estuda-relacao-entre-epidemias-e-desmatamento-das-florestas.ghtml>

Em relação a estas doenças, avalie as afirmativas a seguir.

- I. As zoonoses emergentes ou reemergentes são, respectivamente, doenças novas (exóticas) e doenças que reaparecem após período de declínio significativo da incidência;
- II. Para ser considerada como uma zoonose emergente a taxa de letalidade da doença ou o potencial de causar morte pode variar de 0 a 100%, não sendo características determinantes.
- III. Atuar e intervir sobre as populações de animais alvo, de modo a refletir em benefício à saúde da população humana fazem parte das estratégias executadas pela área de vigilância de zoonoses.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- a) I
- b) II e III
- c) III
- d) I e III

QUESTÃO 4



Sobre a Febre Maculosa Brasileira, marque a alternativa **CORRETA**.

- a) Seus vetores são do gênero Rickettsia sendo seus hospedeiros multiplicadores os equídeos em geral.
- b) É uma doença de gravidade variável, que pode cursar com formas leves e atípicas até formas graves com elevada taxa de letalidade.
- c) Os carrapatos são capazes de transmitir a doença somente no início da vida, em geral de 7 a 15 dias após o último repasto sanguíneo.
- d) Pode apresentar formas atípicas, além da presença de prurido intenso, as alterações comportamentais são frequentes em mamíferos.

QUESTÃO 05



A raiva, cuja sinonímia pode ser encefalite rábica e hidrofobia, caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda que apresenta letalidade de aproximadamente 100%. Sobre esta doença, avalie as afirmativas a seguir.

- I. É uma antropozoonose transmitida ao homem pela inoculação do vírus presente na saliva e secreções do animal infectado.
- II. Apresenta 8 antígenos de superfície, responsáveis pela indução de anticorpos neutralizantes e adsorção vírus-célula.
- III. No Brasil, foram encontradas 2 variantes antigênicas: variante 1, isoladas dos cães e variante 2, isoladas de morcegos e de outros animais silvestres.
- IV. Canídeos silvestres (raposas e cachorro do mato), e outros mamíferos silvestres apresentam importância epidemiológica nos ciclos de transmissão.

É correto apenas o que se afirma em:

- a) I e II.
- b) II e III
- c) I e IV
- d) III e IV.

QUESTÃO 06



Ordene as características dos acidentes por serpentes de importância para a Saúde Pública no Brasil de acordo com a numeração dos grupos de acidentes apresentada a seguir.

Tipos de acidentes por serpentes:

1. Botrópico
2. Crotálico
3. Elapídico

Características dos acidentes

() Manifestações locais – dor e parestesia na região da picada são discretos, não havendo lesões evidentes. Manifestações sistêmicas – fácies miastênica ou neurotóxica. As possíveis complicações são decorrentes da progressão da paralisia da face para músculos respiratórios.

() Manifestações locais – não se evidenciam alterações significativas. Dor e edema são usualmente discretos e restritos ao redor da picada. Eritema e parestesia são comuns. Manifestações sistêmicas – manifestações neuromusculares com progressão crânio-caudal, iniciando-se por ptose palpebral, turvação visual e oftalmoplegia.

() Manifestações locais – dor, edema e equimose na região da picada (pode progredir ao longo do membro acometido). As marcas de picada e sangramento nem sempre são visíveis nos pontos de introdução das presas. Manifestações sistêmicas – sangramentos em pele e mucosas são comuns (gengivorragia, equimoses a distância do local da picada); hematúria, hematêmese e hemorragia em outras cavidades.

A ordem numérica **CORRETA** para correspondência do tipo de acidente com sua característica é:

- a) 1; 2 ;3
- b) 3; 2; 1
- c) 2; 1; 3
- d) 2; 3; 1

QUESTÃO 07



O controle reprodutivo de cães e gatos é uma ação importante para o manejo da população dessas espécies e depende diretamente da participação dos tutores. Espera-se que intervenções bem planejadas e direcionadas possam reduzir a taxa de crescimento das populações, o abandono dos animais e a ocorrência de zoonoses que envolvem essas espécies.

Sobre essa política pública analise as afirmativas a seguir:

- I. A esterilização de cães e gatos melhora a qualidade de vida do animal, prevenindo a morte causada por doenças nas mamas, útero e próstata, além de promover a redução do número de agressões ao ser humano.
- II. Segundo o Sistema Único de Saúde, todos as pessoas têm direitos iguais a receberem o serviço gratuito de esterilização dos seus animais, e critérios de prioridade não devem ser adotados para garantir o princípio da universalidade.
- III. Os integrantes da equipe de trabalho devem estar com esquemas vacinais atualizados, principalmente contra tétano e raiva e a composição mínima da equipe será, obrigatoriamente, de um médico-veterinário e dois auxiliares.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- a) I e II
- b) I e III
- c) II e III
- d) I, II e III

QUESTÃO 08



Em relação às medidas de controle da Leishmaniose Visceral analise as sentenças a seguir:

- I. O uso de coleiras impregnadas com inseticida deltametrina a 4% em cães apresentou resultado satisfatório no controle do vetor, com redução da população vetorial assim como da infecção nos vetores nas áreas com intervenção de encoleiramento, comparadas com áreas controle.
- II. O controle vetorial pode ser realizado por meio do controle químico, com aplicação de inseticidas de ação residual, que tem como objetivo reduzir o contato entre o flebotômíneo e a população humana e, conseqüentemente, diminuir o risco de transmissão do parasito.
- III. A borrifação é direcionada aos insetos adultos, sem gerar impactos ambientais e é de fácil aplicação para o agente e proprietário do imóvel, sendo a medida de controle com menor proporção de recusas em município de grande porte, com transmissão intensa.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- a) I e II
- b) II e III
- c) I e III
- d) I, II e III



TEMAS DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO

QUESTÕES DE 9 A 25

QUESTÃO 09



A cirurgia reconstrutiva apresenta elevado valor na Medicina Veterinária, favorecendo a excisão cirúrgica de neoplasias com margens amplas e também o fechamento de feridas traumáticas. Dentre as técnicas empregadas destacam-se o uso de retalhos subdermais e axiais, enxertos livres, mas também técnicas simples de alívio de tensão. Os retalhos axiais correspondem a uma das técnicas mais robustas a serem aplicadas em feridas cirúrgicas ou traumáticas. Em relação aos retalhos axiais, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) O retalho de padrão axial omocervical pode ser utilizado para cobrir defeitos na região lateral do tórax e abdômen.
- b) O retalho de padrão axial genicular pode ser utilizado para cobrir defeitos na região do membro torácico.
- c) O retalho de padrão axial da artéria íliaca circunflexa profunda é comumente utilizado para cobrir defeitos na região do tórax.
- d) O retalho axial angular da boca inclui as artérias angular da boca, facial e labial superior, servindo para cobrir defeitos na região da mandíbula e maxila.

QUESTÃO 10



Em cirurgia reconstrutiva o fechamento em figuras geométricas permite melhor distribuição da tensão em feridas cirúrgicas e traumáticas, e o reconhecimento das formas favorecem o fechamento. Em relação ao fechamento em figuras geométricas, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Defeitos circulares são comumente criados após a excisão de neoplasias respeitando as margens laterais preconizadas, entretanto o seu fechamento inclui, necessariamente, a aplicação da técnica em V-combinada ou em gravata borboleta.
- b) Para o fechamento de defeitos circulares, a técnica em V-combinada é mais recomendada do que a técnica em gravata borboleta quando existe limitação da pele para reconstrução.
- c) Defeitos retangulares ou quadrados devem ser fechados de forma centrípeta, fechando inicialmente o centro do defeito para adequada redução da tensão.
- d) Defeitos triangulares são de fechamento difícil exigindo sempre retalhos subdermais ou axiais.

QUESTÃO 11



Incisões de relaxamento são técnicas simples utilizadas em cirurgia reconstrutiva. Entretanto, apesar da simplicidade, são raramente indicadas, exceto em regiões distais do membro, próximo ao olho, ânus ou mesmo para favorecer a cobertura de tendões, ligamentos, vasos, nervos e implantes. Considerando as incisões de relaxamento como técnicas de alívio de tensão, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Incisões de relaxamento são realizadas próximo ao defeito e devem sempre ser suturadas após o fechamento da ferida primária.
- b) Múltiplas incisões de relaxamento apresentam melhor aspecto cosmético e possuem menor risco de provocarem comprometimento circulatório.
- c) A plastia em V-Y representa uma forma de incisão de relaxamento comumente indicada em cirurgias na pálpebra.
- d) A plastia em Z facilita o fechamento com menos tensão, sendo criada adjacente à ferida, não devendo nunca ser incorporada diretamente à ferida.

QUESTÃO 12



Na cirurgia oncológica, a ressecção tumoral pode ser classificada em radical, ampla, marginal ou intracapsular, entretanto, diante de neoplasias malignas, somente as abordagens amplas e radicais podem apresentar intenção curativa. Sobre essa classificação assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) A ressecção intracapsular é denominada de “debulking” na literatura internacional, e embora retire toda a doença macroscópica, pode deixar doença microscópica.
- b) A ressecção marginal usualmente deixa doença microscópica aumentando o risco de recorrência tumoral em neoplasias malignas.
- c) A ressecção ampla envolve a ressecção de tecido normal envolvendo o tumor e sua cápsula e é sempre curativa.
- d) A ressecção cirúrgica radical consiste na ressecção de todo o compartimento envolvido pelo tumor, não deixando doença residual no local e dispensando a necessidade de novas terapias locais e sistêmicas no paciente com câncer.

QUESTÃO 13



A hérnia perineal é uma patologia observada comumente nos cães, no qual seu tratamento é a herniorrafia. Com relação a essa patologia e seu tratamento, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Quando há a retroflexão da bexiga e aprisionamento visceral, a cirurgia de herniorrafia deve ser realizada em caráter de urgência, após tentativas de redução manual do conteúdo do saco herniário.
- b) Os cães castrados apresentam uma taxa de recidiva cirúrgica 3 vezes maior que os cães não castrados.
- c) A técnica cirúrgica de transposição do músculo obturador interno tem a vantagem de promover menos tensão nas suturas para fechamento do defeito, além de provocar menor deformação do ânus.
- d) São estruturas importantes que estão na região da abordagem cirúrgica os músculos esfíncter uretral externo, músculo elevador do ânus, obturador interno e nervo, artéria e veia pudenda externa.

QUESTÃO 14



O pneumotórax traumático é um acúmulo de ar no espaço pleural decorrente geralmente de um atropelamento ou mordedura, podendo, portanto, tornar-se uma emergência cirúrgica respiratória. Com relação a essa emergência e seu tratamento, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) O pneumotórax traumático pode ser classificado em aberto, fechado ou por tensão.
- b) O cão com pneumotórax geralmente apresenta um padrão respiratório restritivo (respirações rápidas e curtas) e sons pulmonares abafados dorsalmente na ausculta.
- c) Em animais com pneumotórax aberto, o fechamento definitivo de grandes defeitos da parede requer mobilização de músculos adjacentes para garantir um fechamento resistente ao ar.
- d) A conduta médica inicial é avaliar o paciente e realizar a radiografia, para constatação do ar no espaço pleural.

QUESTÃO 15



A dilatação vólculo gástrica (DVG) é uma condição aguda com alta taxa de mortalidade, sendo considerada uma emergência cirúrgica. Com relação a sua fisiopatologia e tratamento, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) A dilatação vólculo gástrica pode ser diferenciada da dilatação gástrica sem vólculo simplesmente porque consegue se passar um tubo gástrico.
- b) O objetivo inicial do tratamento é a estabilização do paciente, iniciando-se com a administração de fluidos isotônicos através de vasos calibrosos como as veias jugulares e veias safenas, e a descompressão gástrica por meio de tubo orogástrico.
- c) Os objetivos do tratamento cirúrgico são três: inspecionar o estômago e o baço para identificar e remover tecidos lesionados; descomprimir o estômago e corrigir o mau posicionamento; e realizar a gastropexia.
- d) Geralmente, quando ocorre DVG, o estômago sofre rotação no sentido anti-horário, quando visto da perspectiva do cirurgião (cirurgião a direita do cão em decúbito dorsal), podendo ser de 90 a 360 graus.

QUESTÃO 16



O prolapso da glândula da terceira pálpebra é o distúrbio primário mais comum na terceira pálpebra. Com relação a essa patologia e seu tratamento, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) O prolapso da glândula pode ser uni ou bilateral, e geralmente ocorre em animais jovens, com menos dos 2 anos de idade.
- b) O tratamento cirúrgico geralmente indicado é reposicionamento da glândula ou sua extirpação.
- c) As técnicas cirúrgicas de ancoramento são as que apresentam menos recidivas quando comparada as técnicas de envelope.
- d) O prolapso da glândula pode ser resultado da fraqueza do tecido conjuntivo entre a porção ventral da terceira pálpebra e os tecidos periorbitários, fazendo com que essa glândula se mova dorsalmente.

QUESTÃO 17



As cirurgias do bulbo ocular e da órbita são procedimentos comumente realizados em cães e gatos. Com relação a esses procedimentos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) A exenteração envolve a remoção da conjuntiva, da periórbita, dos músculos extra-oculares e do bulbo ocular, podendo ser indicada nos casos de tumores orbitários.
- b) A enucleação é a cirurgia orbitária mais comum, sendo a técnica transpalpebral a mais realizada, pois remove o bulbo, a terceira pálpebra e as margens palpebrais, após cantotomia e dissecação da conjuntiva bulbar.
- c) A evisceração envolve a remoção de todo o conteúdo intra-ocular, deixando somente a túnica fibrosa, indicado em casos onde o objetivo é eliminar a dor em olhos cegos sem enoftalmia séptica ou neoplasias.
- d) A complicação pós-operatória mais comum após procedimentos de enucleação é a hemorragia dentro das primeiras horas após o procedimento, no qual resulta em um aumento de volume no local da cirurgia.

QUESTÃO 18

Considere a seguinte situação: uma cadela SRD em trabalho de parto por aproximadamente oito horas, com nascimento de três filhotes vivos e retenção uterina de outros filhotes apresenta, ao exame obstétrico, ausência de contrações útero-abdominais. Com relação a situação descrita, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) O diagnóstico provável é de atonia uterina primária ou contrações uterinas débeis de origem primária.
- b) O diagnóstico provável é alteração de colo uterino que é comum na espécie canina e leva à exaustão da musculatura uterina e abdominal
- c) O diagnóstico provável é de atonia uterina secundária com exaustão da musculatura uterina e esgotamento físico da parturiente, verificada nas distocias de causa fetal.
- d) A causa pode ser uma disfunção hormonal ligada ao estrógeno e à ocitocina ou à hipocalcemia/hipoglicemia/hipomagnesemia.

QUESTÃO 19

Referente à gonadectomia precoce em cães e gatos assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) A castração precoce em cães e gatos, machos e fêmeas, atrasa o fechamento das placas epifisárias em média de 8 a 9 semanas, resultando no aumento do comprimento ósseo.
- b) O risco de tumores mamários em cadelas e gatas castradas antes do primeiro estro é de 0,05%.
- c) Cadelas e cães apresentam maior risco de desenvolver incontinência urinária quando a castração é realizada após um ano de idade.
- d) Vulva, pênis e prepúcio persistem com aspecto infantil quando a castração é precoce, diferentemente das glândulas mamárias que não são afetadas.

QUESTÃO 20



Referente à placenta de cadelas e gatas assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) A placenta é o órgão responsável pelas trocas metabólicas materno-fetais apenas durante o primeiro terço gestacional.
- b) A placenta de cadelas e gatas é classificada como endotélio-corial, zonária e decídua.
- c) A placentação consiste na justaposição das vilosidades do alantoide fetal (*pars fetalis* da placenta) com as criptas da mucosa uterina (*pars uterina* da placenta).
- d) As funções da placenta são comparáveis àquelas realizadas pelos sistemas respiratório, renal e nervoso.

QUESTÃO 21



As complicações associadas às castrações podem ocorrer, mas podem ser evitadas utilizando-se adequada técnica cirúrgica, manipulação cuidadosa, boa hemostasia e técnicas assépticas. Considerando essas questões assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Hemorragia excessiva pode ocorrer quando a cadela é castrada durante as fases do estro e diestro.
- b) Tratos fistulosos e granulomas podem ocorrer quando se utiliza material de sutura não absorvível, sendo que as fístulas normalmente estão localizadas no flanco com presença de secreção sanguinolenta ou mucopurúlela.
- c) Dentre as causas de incontinência urinária em cadelas incluem-se baixos níveis de progesterona e granulomas de coto uterino com aderências na bexiga.
- d) A ligadura de ureter pode ocorrer se a bexiga estiver repleta/distendida e o trígono vesical/junção ureterovesical estiverem deslocados caudalmente.

QUESTÃO 22



Sobre cirurgias do aparelho digestório, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) As artérias gástricas presentes na curvatura maior e gastroepiploica, presente na curvatura menor suprem o estômago e são derivadas da artéria celíaca.
- b) Alta taxa de complicação após cirurgias do esôfago têm tido como causas a ausência de cobertura por serosa, ausência de omento, suprimento sanguíneo segmentar, movimentação e distensão constantes com passagem de bolos alimentares.
- c) Numa intussuscepção existe a porção invaginada, chamada de intussuscepto e o segmento envelopante, chamado de intussusceptiente.
- d) A esofagorrafia é usualmente realizada em camada dupla, sendo uma interna (mucosa e submucosa), no padrão Swift. O Segundo plano (adventícia, muscular e submucosa) pode ser realizado com sutura simples interrompida ou contínua.

QUESTÃO 23



Sobre o emprego de imobilizações em fraturas e luxações, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) As talas metálicas em calha são utilizadas para proporcionar apoio às lesões no rádio proximal e ulna, carpo ou tarso, metacarpo ou metatarso e falanges.
- b) As talas externas podem ser usadas para proporcionar apoio temporário ao membro ou como meio temporário de estabilização da fratura.
- c) As bandagens de Ehmer previnem o suporte de peso sobre o membro pélvico e são muito utilizadas como apoio de reduções de luxação da articulação coxofemoral aberta ou fechada.
- d) As bandagens de spica são utilizadas geralmente como talas temporárias para imobilizar fraturas de úmero e fêmur ou como estabilização adjunta após uma fixação interna.

QUESTÃO 24



Sobre fraturas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) As fraturas Salter Harris Tipo III ocorrem na fise e em uma porção da metáfise e as tipo II, percorrem a fise e a epífise.
- b) As fraturas por avulsão acontecem quando o ponto de inserção de um tendão ou ligamento é fraturado e distanciado do restante do osso.
- c) Uma fratura em “galho verde”, que ocorre em animais imaturos, é uma fratura incompleta na qual uma porção do córtex está intacta, estabilizando o osso em alguma porção.
- d) As linhas de fraturas oblíquas percorrem em um ângulo à linha perpendicular com o eixo longitudinal do osso.

QUESTÃO 25



Sobre neurologia em pequenos animais, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) A avaliação da natureza da disfunção neurológica como neurônio motor inferior ou neurônio motor superior é importante para fins de localização, mas não afeta o prognóstico.
- b) A abordagem dorsal para cirurgia de coluna cervical é utilizada para descomprimir a medula espinhal e remover compressões situadas dorsal ou lateralmente.
- c) Na classificação de fratura/luxação cervical como estável ou instável, o modelo de três compartimentos é frequentemente utilizado para avaliar a probabilidade de instabilidade.
- d) A mielografia é contraindicada em pacientes com pressão intracraniana elevada, mas é indicada em pacientes com doença inflamatória do sistema nervoso central.



RASCUNHO DO GABARITO

Área: Clínica Cirúrgica em Animais de Companhia

Nome: _____

USE SOMENTE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA PARA MARCAR SUA RESPOSTA

PREENCHA CORRETAMENTE COMO INDICADO: ●

Saúde Pública				
1	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Área de concentração específica									
9	A	B	C	D	17	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	A	B	C	D	18	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	A	B	C	D	19	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	A	B	C	D	20	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13	A	B	C	D	21	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14	A	B	C	D	22	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15	A	B	C	D	23	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16	A	B	C	D	24	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					25	A	B	C	D
						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



