

# PROGRAMA DE RESIDÊNCIA INTEGRADA EM MEDICINA VETERINÁRIA

## ESCOLA DE VETERINÁRIA

### UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

#### ÁREA: CLÍNICA CIRÚRGICA EM ANIMAIS DE COMPANHIA

#### ENTRADA 2025

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 25 questões numeradas de 1 a 25, dispostas da seguinte maneira:
    - a. As questões de número 01 a 08 são relativas aos temas de Saúde Pública
    - b. As questões de 09 a 25 são específicas da área de concentração que você se inscreveu
  2. Confira se o seu caderno de questões contém a quantidade de questões e se essas estão na ordem mencionada na instrução anterior. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente divergência, comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.
  3. Assine o seu nome no espaço próprio do CARTÃO RESPOSTA, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
  4. Não dobre, não amasse nem rasure o CARTÃO RESPOSTA, pois ele não poderá ser substituído.
  5. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas quatro opções de resposta identificadas com as letras A, B, C, D. Apenas uma responde corretamente à questão.
  6. No CARTÃO RESPOSTA preencha todo o espaço compreendido no círculo correspondente à opção escolhida. A marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
  7. O tempo disponível para esta prova é de **duas horas e trinta minutos**.
  8. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
  9. Quando terminar a prova, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO RESPOSTA.
  10. Você poderá deixar o local da prova somente após decorrido uma hora do início da aplicação. Poderá levar seu CADERNO DE QUESTÕES, ao deixar em definitivo a sala de provas nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova.
  11. Você será excluído do exame no caso de:
    - a) prestar, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
    - b) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer participante ou pessoa envolvida no processo de aplicação das provas;
    - c) perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação da prova, incorrendo em comportamento indevido durante a realização do exame;
    - d) se comunicar, durante a prova, com outro participante verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma;
    - e) utilizar qualquer tipo de equipamento eletrônico e de comunicação durante a realização do exame;
    - f) utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento, em benefício próprio ou de terceiros, em qualquer etapa do exame;
    - g) estar trajando boné ou chapéu ou portar arma de fogo;
    - h) utilizar livros, notas ou impressos durante a realização do exame;
    - i) se ausentar da sala levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES antes do prazo estabelecido e / ou o CARTÃO RESPOSTA a qualquer tempo.
- 
-

# TEMAS DE SAÚDE PÚBLICA

## QUESTÕES DE 01 A 08

### QUESTÃO 01



Observe a manchete de jornal a seguir.

## Cães sem coleira mordem nádega e perna de idosa em praia do litoral de SP: 'achei que ia brincar'

Mulher de 63 anos estava na beira do mar quando foi surpreendida por cachorros, que seguiam homem de bicicleta. Caso aconteceu em Mongaguá (SP).

Por **Nicole Vasques**, g1 Santos

10/10/2024 05h23 · Atualizado há 2 meses

Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2024/10/10/caes-sem-coleira-mordem-nadega-e-perna-de-idosa-em-praia-do-litoral-de-sp-achei-que-ia-brincar.ghtml>

Sobre as medidas determinadas pelo Guia de Vigilância em Saúde no capítulo sobre a raiva, marque a alternativa **CORRETA**.

- A) Mesmo se os animais estiverem sadios no momento do acidente, é importante que sejam mantidos em observação por 180 dias.
- B) Deve-se avaliar se o animal estava sadio ou se apresentava sinais sugestivos de raiva. A maneira como ocorreu o acidente pode fornecer informações sobre seu estado de saúde.
- C) A excreção de vírus rábico pela saliva, ou seja, o período em que os cães poderiam transmitir a doença, se inicia a partir do primeiro dia do período de incubação.
- D) Animais que passam longos períodos fora do domicílio, sem controle, devem ser considerados como animais de risco, apenas se não tiverem recebido vacinas.

## QUESTÃO 2

Em um programa de manejo ético populacional em *campi* universitários, deve-se pensar em estratégias para que haja uma normatização interna específica. Sobre as legislações a serem seguidas em Minas Gerais tem-se:

- I. A Lei Federal Nº 14.228/21 que dispõe da proibição da eliminação de cães e gatos como forma de controle populacional pelos órgãos de zoonoses, canis públicos e estabelecimentos oficiais.
- II. A Lei Federal nº 13.426/2017 que dispõe sobre a política de controle de natalidade de cães e gatos, por método seguro e permanente, e determina que os programas devem realizar estudo da localidade e da população, além da obrigatoriedade de desenvolver ações educativas.
- III. A Lei Estadual nº 21.970/2016 que dispõe sobre a proteção, a identificação e o controle populacional de cães e gatos, regulamenta e autoriza a eutanásia de animais sem tutor como medida de controle populacional, além de definir como devem ser realizadas ações de identificação e registro.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- A) I e II.
- B) II e III.
- C) I e III.
- D) I, II e III.

### QUESTÃO 3

O conhecimento e o controle das populações de escorpiões de maneira oportuna, visando à redução do número de acidentes e, conseqüentemente, a morbimortalidade, são atribuições do Médico Veterinário na Saúde Pública. Sobre isso, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) A ocorrência de acidentes por escorpião é de notificação compulsória no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde, e deve ser comunicada de maneira imediata ao serviço de vigilância em saúde e de vigilância e controle de animais peçonhentos, quando este existir.
- B) *Tityus serrulatus* (escorpião amarelo) é o principal causador de acidentes e óbitos no Brasil.
- C) O controle químico é a principal medida de controle recomendada pelo Ministério da Saúde, especialmente em áreas com elevada presença de baratas, seu principal alimento e atrativo em meio urbano.
- D) Algumas espécies possuem reprodução partenogenética, ou seja, as fêmeas conseguem se reproduzir sem a presença do macho, produzindo outras fêmeas, o que contribui para sua rápida propagação.

#### QUESTÃO 4

A esporotricose é a micose de implantação ou subcutânea mais prevalente e globalmente distribuída, causada por fungos do gênero *Sporothrix*. Sobre essa importante zoonose analise as sentenças a seguir:

- I. Os gatos são uma importante fonte de infecção, podendo transmitir a esporotricose por arranhadura ou mordedura. Não existem relatos de transmissão por contato com secreções de lesões cutâneo-mucosas nem respiratórias durante episódios de tosse e espirro.
- II. Na esporotricose de transmissão felina, a alta carga infectante geralmente determina períodos de incubação mais curtos, de uma a duas semanas.
- III. Recentemente foram descritos casos da doença transmitidas por procedimentos de tatuagem.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- A) I e II.
- B) II e III.
- C) I e III.
- D) I, II e III.

## QUESTÃO 05



Para atuar em casos de acumulação de animais, o médico veterinário precisa identificar os casos corretamente e saber diferenciá-los de outras situações que envolvam animais. Analise as sentenças a seguir relacionadas aos principais indicadores que devem ser observados em uma primeira visita a um possível caso de acumulação de animais:

- I. **Moradia:** desorganização do espaço, os cômodos perdem a função original. Exemplo: o sofá perdeu a função de sentar, a pia perdeu a função de lavar, e assim por diante.
- II. **Animais:** os animais são privados de bem-estar, não há conforto e as condições de higiene são precárias.
- III. **Pessoa:** a pessoa em situação de acumulação tende a negar o problema, o que pode vir acompanhado da falta de entendimento da questão, não aceitando a doação e tratamento dos animais.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- A) I e II.
- B) II e III.
- C) I e III.
- D) I, II e III.

## QUESTÃO 06

Os roedores representam cerca de 40% das espécies de mamíferos existentes e são capazes de se adaptar a diversas condições ecológicas, sobrevivendo em diferentes climas e altitudes, por meio de um grande número de adaptações morfológicas e fisiológicas, de acordo com seu estilo de vida. Sobre esses animais, analise as afirmativas a seguir:

- I. Das espécies de roedores consideradas sinantrópicas, três participam do ciclo de transmissão de doença, sendo a ratazana (*Rattus norvegicus*) a de maior relevância para a saúde pública.
- II. O camundongo (*Mus musculus*) é a menor das três espécies e as infestações geralmente são altas e de difícil controle com rodenticidas pelo hábito exacerbado de neofobia (medo do novo) da espécie.
- III. As trilhas com manchas de gordura deixadas pelo atrito do corpo do *Rattus rattus* (rato de telhado) com as estruturas verticais das construções humanas, como os cantos das paredes, das vigas etc., denotam sua presença e são decorrentes das constantes passagens do animal pelos mesmos caminhos.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- A) I e II.
- B) II e III.
- C) I e III.
- D) I, II e III.

## QUESTÃO 07



O médico veterinário tem papel fundamental na vigilância e na interrupção dos ciclos de violência, promovendo um contexto de saúde única, salvando vidas humanas e reduzindo o sofrimento dos animais. Sobre a Teoria do Elo, marque a resposta **INCORRETA**:

- A) No Brasil, o tipo mais comum de maus-tratos contra animais é a crueldade, também chamada de maus-tratos do tipo intencional.
- B) O número de cães e gatos em casa, o nível educacional dos proprietários, as dificuldades econômicas e a presença de pessoas com deficiência são fatores associados com a ocorrência de negligência animal.
- C) A mulher é a principal vítima no contexto da “Teoria do Elo”, que se revela na realidade da violência doméstica. Essa é a mais comum das violências contra a mulher, deve ser detectada pelo profissional de saúde e encarada como uma questão de saúde pública.
- D) Os animais têm sido alvo de abuso e agressão na pretensão de atingir uma pessoa. No âmbito familiar de jovens infratores foi verificado que muitos tiveram seus animais mortos por seus pais ou responsáveis, como forma de correção, repressão ou punição às atitudes dos mesmos.



## QUESTÃO 08



Sobre a Febre Maculosa Brasileira, leia as afirmativas a seguir

- I. A febre maculosa brasileira é uma doença infecciosa febril, de curso crônico e gravidade variável, cuja apresentação clínica pode variar desde as formas leves e atípicas até formas graves, com elevada taxa de letalidade.
- II. Embora seja o sinal clínico mais importante, o exantema pode estar ausente, o que pode dificultar e/ou retardar o diagnóstico e tratamento, determinando uma maior letalidade.
- III. Na Reação de Imunofluorescência indireta (RIFI), a confirmação diagnóstica ocorre quando há dois resultados reagentes, independente dos títulos de anticorpos, observado em amostras pareadas de soro.
- IV. A partir da suspeita de febre maculosa, a terapêutica com antibióticos deve ser iniciada imediatamente, não se devendo esperar a confirmação laboratorial do caso.

Estão **CORRETAS** apenas as afirmativas:

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e IV.
- D) III e IV.



## TEMAS DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO

### QUESTÕES DE 9 A 25

#### QUESTÃO 09



Sobre displasia coxofemoral, marque a opção **ERRADA**:

- A) Alterações observadas ao exame físico nos animais idosos incluem dor, redução da amplitude de movimento, atrofia da musculatura pélvica, crepitação e ausência de lassidão articular.
- B) As radiografias de tração (Penn Hip) podem ser utilizadas para detectar a susceptibilidade das raças à displasia coxofemoral aos quatro meses de idade.
- C) A excisão da cabeça e do colo do fêmur permite a formação de uma pseudoarticulação fibrosa que pode ser indicado para raças grandes e gigantes nas quais outros tratamentos foram ineficazes ou são impraticáveis.
- D) O ângulo de redução é o ponto medido no qual a cabeça do fêmur retorna para o acetábulo durante a adução do membro, e o ângulo de subluxação é o ponto medido no qual a cabeça do fêmur escorrega para fora do acetábulo durante a abdução do membro.

## QUESTÃO 10



Sobre trauma cranioencefálico, marque a opção **ERRADA**:

- A) A lesão primária ocorre imediatamente após o impacto e inicia uma série de processos bioquímicos que resulta na lesão cerebral secundária.
- B) Hipotensão e hipoxemia, condições extracranianas podem agravar a isquemia cerebral, aumentando assim os eventos responsáveis pela lesão cerebral secundária.
- C) As fraturas do crânio podem contribuir com o trauma contínuo ao parênquima cerebral, sua estabilização e remoção de hemorragia intracraniana podem diminuir a morbidade associada a lesões primárias.
- D) Na lesão secundária, o glutamato, neurotransmissor inibitório, provoca aumento dos níveis intracelulares de cálcio que ativa a cascata do ácido aracdônico e a via xantina oxidase.

## QUESTÃO 11



Sobre neurologia clínica-cirúrgica da coluna cervical, marque a opção **ERRADA**:

- A) Procedimentos cirúrgicos mais comuns para a medula espinhal cervical são a criação de um defeito ósseo na face ventral de um espaço intervertebral e laminectomia dorsal.
- B) Perda de função motora ocorre em animais com mielopatias cervicais compressivas, mas é menos comum do que com mielopatias toracolombares.
- C) Abordagem cirúrgica dorsal permite a descompressão ampla e o acesso a regiões dorsais e laterais da medula espinhal cervical, enquanto na abordagem ventral, a exposição do canal vertebral e da medula espinhal é muito limitada.
- D) Pacientes deambulatórios com mielopatia cervical cranial tendem a ter evidente fraqueza nos membros pélvicos e ataxia, com menos gravidade e, por vezes, sutil disfunção dos membros torácicos.

## QUESTÃO 12



Sobre fratura vertebral, marque a opção **ERRADA**:

- A) Luxação por fratura da coluna cervical ocorre menos comumente do que na coluna toracolombar.
- B) A descompressão cirúrgica da medula espinhal normalmente não deve ser realizada em cenários de fratura/luxação da coluna vertebral sem algum nível de estabilização conferida.
- C) Trauma espinhal cervical decorrente de traumatismo relativamente pequeno, é importante considerar a possibilidade de uma fratura patológica
- D) O modelo de três compartimentos é frequentemente usado para avaliar a probabilidade de instabilidade, com ruptura de mais de três dos compartimentos constituindo evidência de instabilidade.

### QUESTÃO 13



Doenças da terceira pálpebra são frequentes em cães, podendo ser de origem anômalo, congênito e do desenvolvimento, podendo ser caracterizadas por protusão e mudanças na estrutura. Com relação ao distúrbio de eversão da cartilagem do eixo da terceira pálpebra, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Geralmente não se observa alterações como ceratite ou úlceras de córnea no cão, já que a cartilagem evertida não está em contato com a córnea.
- B) O tratamento mais frequente é a simples excisão da porção dobrada da cartilagem da terceira pálpebra através da superfície conjuntiva bulbar.
- C) A eversão da cartilagem é o distúrbio primário mais comum da terceira pálpebra, necessitando sempre de tratamento cirúrgico.
- D) O reposicionamento cirúrgico da porção evertida é um dos tratamentos que podem ser realizados, podendo ser realizado pelos métodos de bolso ou envelope.

#### QUESTÃO 14



A descoberta em 1928 do antibiótico penicilina representou um marco no desenvolvimento do tratamento clínico e cirúrgico, pois possibilitou realização de cirurgias mais complexas. Entretanto, as infecções pós-operatórias ainda continuam sendo as complicações mais comuns no paciente cirúrgico. Com relação aos antimicrobianos, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O uso isolado de um antimicrobiano é a terapêutica mais recomendada, pois associações de antimicrobianos podem induzir a resistência microbiana.
- B) O metronidazol é amplamente utilizado nos pacientes cirúrgicos, pois é uma agente bactericida que seleciona baixa resistência de bactérias, atuando tanto em bactérias aeróbicas e anaeróbicas.
- C) As cefalosporinas de terceira geração, como a ceftriaxona, são amplamente utilizadas em pacientes cirúrgicos, pois possuem um espectro de ação superior as cefalosporinas de 1º e 2º geração, sendo ativa diante de uma gama maior de bacilos gram-negativos, entretanto possuindo menor atividade contra gram-positivos.
- D) Em pacientes hospitalizados deve sempre administrar o antimicrobiano por via intravenosa, em *bolus*, e mantendo dessa forma a administração, pois dessa assim ele atinge concentrações mais adequadas no sangue, não diminuindo dessa forma seu efeito.

## QUESTÃO 15



As cirúrgicas dos rins e ureteres estão cada vez mais frequentes no dia a dia das cirurgias de animais de companhia, principalmente decorrente de presença de cálculos nesses órgãos. Com relação aos procedimentos cirúrgicos nesses órgãos, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A nefrotomia normalmente está indicada para remover cálculos alojados na pelve renal. Contudo essa técnica pode diminuir temporariamente a função renal em cerca de 25 a 50%.
- B) A pielolitomia deve ser indicada para remoção somente de cálculos presentes na pelve renal, devendo a incisão ser realizada sobre a pelve renal, e a sutura realizada sempre em padrão separado para evitar deiscência.
- C) A ureterotomia está indicada para remover cálculos no ureter que estão causando obstrução ureteral. A incisão sobre o ureter deve ser sempre transversa, de forma a evitar estenose ureteral.
- D) Materiais de sutura absorvível como o ácido poliglicólico, poligliconato, poliglicaprone 25 e polidioxanona são fios monofilamentares e indicados para sutura nos rins e ureteres, estando contra indicado para sutura nesse órgãos o fio poliglactina 910, por ser multifilamentar e possuir capilaridade.



## QUESTÃO 16



As técnicas de gastropexia são indicadas para aderir de forma permanente ou temporário o estômago na parede abdominal. Com relação a gastropexia, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A técnica de gastropexia com tubo (gastrostomia) é relativamente simples de se realizar, e permite introdução de alimentos no estômago. Entretanto, essa técnica está relacionada a muitas complicações no pós-operatório, onde comumente se observa extravasamento de conteúdo gástrico no peritônio.
- B) A gastropexia em alça de cinto é a mais indicada quando o animal possui dilatação torção gástrica, já que forma uma aderência mais forte que a maioria das outras técnicas.
- C) Na gastropexia circuncostal realiza-se um retalho articulado seromuscular da região do antro pilórico e este circunda a 11<sup>o</sup> ou 12<sup>o</sup> costela. Além de ser uma técnica desafiante na sua execução, pode causar pneumotórax e fratura de costela.
- D) A gastropexia incisional deve ser evitada realizar em cães com dilatação torção gástrica, devido geralmente ao porte grande dos cães com essa patologia, já que é uma técnica que promove pouca aderência, podendo dessa forma ter deiscência e soltura do estômago.

## QUESTÃO 17



O trauma torácico é uma emergência comum no dia a dia da rotina clínica, principalmente decorrente de atropelamentos e brigas. Com relação ao trauma torácico e/ou os procedimentos cirúrgicos realizados para o tratamento, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O tórax instável ocorre quando duas ou mais costelas são fraturadas em dois pontos, sendo o seu tratamento clínico, onde o paciente deve ter o tórax envolvido por uma atadura.
- B) Recomenda-se em casos de trauma torácico por mordedura realizar a exploração cirúrgica logo de imediato, na admissão do paciente, a fim de desbridar o tecido desvitalizado, reduzindo assim o grau de contaminação.
- C) A presença de fratura de costelas nos casos de trauma torácico está associada a um prognóstico reservado a desfavorável, pois aumenta a morbidade e mortalidade do paciente.
- D) Os animais com contusão pulmonar e trauma na parede torácica devem ser estabilizados antes de se realizar a correção cirúrgica das fraturas. Assim, utilização de oxigenioterapia e antimicrobianos são indicados nos casos de contusões e/ou hemorragias pulmonares.

## QUESTÃO 18



Dentre as técnicas de cirurgia reconstrutiva, destacam-se aquelas que utilizam os retalhos de padrão axial, caracterizados pela incorporação de uma artéria e veia cutâneas diretas na base do retalho. Acerca dos retalhos de padrão axial, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) O retalho da angular da boca (angular oris) é um retalho robusto que conta com ramos das artérias angular da boca, facial e labial superior.
- B) O retalho do conduto safeno reverso é um retalho venoso utilizado para cobrir defeitos na face medial do membro pélvico, acima da patela.
- C) O retalho lateral da cauda é particularmente útil para a cobertura de defeitos no períneo ou região lombossacra.
- D) O retalho da artéria epigástrica superficial caudal é um retalho robusto eficiente na cobertura de defeitos na região do flanco.

## QUESTÃO 19



Dentre as técnicas de cirurgia reconstrutiva, destacam-se aquelas que utilizam os retalhos de padrão axial, caracterizados pela incorporação de uma artéria e veia cutâneas diretas na base do retalho, sendo fundamental o reconhecimento da anatomia para adequada localização e delimitação do retalho no planejamento cirúrgico. Acerca dos retalhos de padrão axial, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Os ramos dorsais e ventrais do retalho da artéria ilíaca circunflexa profunda têm sua base cranial à crista ilíaca.
- B) A base do retalho da artéria toracodorsal se localiza na borda cranial da terceira costela, no ponto tocado pelo olecrano, com o membro torácico em flexão.
- C) A base do retalho da artéria toracodorsal se localiza na depressão cranial à escápula.
- D) O retalho da artéria temporal superficial tem sua base situada próximo à comissura labial.

## QUESTÃO 20



Nas cirurgias oncológicas a amplitude da cirurgia foi definida por Enneking (1983) para tumores musculoesqueléticos, mas é extrapolada para ressecções de neoplasias em outros locais, principalmente na pele. Acerca dessa classificação, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Cirurgias radicais envolvem a remoção completa de um compartimento ou estrutura, sendo contraindicadas na oncologia pela mutilação provocada.
- B) A ressecção intracapsular, também denominada “debulking”, deixa apenas doença microscópica.
- C) Cirurgias marginais usualmente deixam doença macroscópica e microscópica, implicando na necessidade da instituição de terapias adjuvantes locais e sistêmicas.
- D) Cirurgias amplas exigem programação adequada das margens cirúrgicas necessárias, que dependem do tipo tumoral, graduação e tamanho.

## QUESTÃO 21



A linfonodectomia permanece como um assunto polêmico na Oncologia Veterinária, e vários aspectos devem ser considerados na programação cirúrgica de um paciente com câncer. Acerca da linfonodectomia assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Tem-se recomendado a remoção conjunta do tumor primário, vasos linfáticos e linfonodos drenantes em uma ressecção em bloco, o que pode ser facilmente realizado na maioria dos pacientes oncológicos.
- B) Excluindo-se o mastocitoma, em que a classificação das metástases em linfonodos ainda é controversa, a ressecção de linfonodos metastáticos raramente é curativa, mas pode aumentar a resposta à radioterapia ou quimioterapia adjuvante ao reduzir a carga tumoral do paciente.
- C) O linfonodo sentinela é o linfonodo regional, mais próximo de uma neoplasia.
- D) Na ausência de linfadenopatia palpável não existe benefício na ressecção profilática do linfonodo sentinela.

QUESTÃO 22



A cirurgia citorrredutora é um assunto polêmico na Oncologia Veterinária. Sobre esse tema assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) A cirurgia citorrredutora, apesar de ainda deixar células neoplásicas no paciente, pode melhorar a resposta à terapias adjuvantes locais e sistêmicas.
- B) A remoção de 99,9% de um tumor de 1cm não deixa um número de células clinicamente irrelevante para o prognóstico do paciente.
- C) A cirurgia citorrredutora é frequentemente indicada como uma abordagem curativa para pacientes oncológicos.
- D) Cirurgia marginal intencional sem terapias adjuvantes mostra-se eficiente no controle de sarcomas de tecidos moles em cães.

### QUESTÃO 23



Sobre parto fisiológico em cadelas e gatas, assinale a afirmativa **CORRETA**:

- A) As fases do parto fisiológico são: delivramento, fase prodrômica, fase de dilatação e fase de expulsão fetal.
- B) Sabe-se que dois a três dias que antecedem ao parto, as cadelas podem apresentar inquietação, isolamento, hiporexia e fazem ninho, comportamentos estes que parecem estar relacionados à elevação da prolactina.
- C) A fase de expulsão se caracteriza pela ruptura apenas da bolsa amniótica e apenas contrações uterinas.
- D) No parto de cadelas, muito raramente os neonatos nascem em apresentação posterior.



## QUESTÃO 24



Sobre piometra em cadelas, assinale a afirmativa **CORRETA**:

- A) Piometra é uma condição que ocorre no estro, a cadela pode apresentar azotemia pré-renal devido à menor perfusão, desidratação e choque, havendo riscos potenciais à vida.
- B) Hidratação, correção de desequilíbrios eletrolíticos/ácido-base e antibioticoterapia são condutas indicadas no pré-cirúrgico e o prognóstico melhora quando a azotemia é corrigida antes da ovariohisterectomia.
- C) Na ovariohisterectomia de cadelas com piometra, o “gancho utilizado em castração”, conhecido como gancho de Snock, é um instrumental utilizado para exteriorizar o útero.
- D) Nos casos de piometra, a morbidade e a mortalidade não estão relacionadas às alterações metabólicas e disfunção dos órgãos, mas sim ao momento que a ovariohisterectomia é realizada.

**QUESTÃO 25**



Considerando as afecções prostáticas em cães, assinale a afirmativa **CORRETA**:

- A) A hiperplasia prostática benigna é a afecção prostática mais comum em cães, está relacionada com a idade e ocorre em 95% dos cães a partir dos dois anos de idade.
- B) A próstata aumentada de tamanho/volume pode estar associada à ocorrência de hérnia inguinal.
- C) A orquiectomia causa involução prostática permanente um ano após a cirurgia.
- D) Embora a neoplasia prostática seja uma doença incomum em cães (0,2 a 0,6%) e rara em gatos, sabe-se que ela é a doença prostática de maior ocorrência em cães castrados.



**RASCUNHO DO GABARITO**

**ÁREA: Clínica Cirúrgica em Animais de Companhia**

Nome: \_\_\_\_\_

USE SOMENTE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA PARA MARCAR SUA  
RESPOSTA

PREENCHA CORRETAMENTE COMO INDICADO:



| Saúde Pública |                       |                       |                       |                       |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1             | A                     | B                     | C                     | D                     |
|               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2             | A                     | B                     | C                     | D                     |
|               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3             | A                     | B                     | C                     | D                     |
|               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4             | A                     | B                     | C                     | D                     |
|               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5             | A                     | B                     | C                     | D                     |
|               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6             | A                     | B                     | C                     | D                     |
|               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7             | A                     | B                     | C                     | D                     |
|               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8             | A                     | B                     | C                     | D                     |
|               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

| Área de concentração específica |                       |                       |                       |                       |    |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 9                               | A                     | B                     | C                     | D                     | 17 | A                     | B                     | C                     | D                     |
|                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 10                              | A                     | B                     | C                     | D                     | 18 | A                     | B                     | C                     | D                     |
|                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 11                              | A                     | B                     | C                     | D                     | 19 | A                     | B                     | C                     | D                     |
|                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 12                              | A                     | B                     | C                     | D                     | 20 | A                     | B                     | C                     | D                     |
|                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 13                              | A                     | B                     | C                     | D                     | 21 | A                     | B                     | C                     | D                     |
|                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 14                              | A                     | B                     | C                     | D                     | 22 | A                     | B                     | C                     | D                     |
|                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 15                              | A                     | B                     | C                     | D                     | 23 | A                     | B                     | C                     | D                     |
|                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 16                              | A                     | B                     | C                     | D                     | 24 | A                     | B                     | C                     | D                     |
|                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|                                 |                       |                       |                       |                       | 25 | A                     | B                     | C                     | D                     |
|                                 |                       |                       |                       |                       |    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |



