

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA INTEGRADA EM MEDICINA VETERINÁRIA

ESCOLA DE VETERINÁRIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

ÁREA: CLÍNICA CIRÚRGICA EM ANIMAIS DE COMPANHIA

ENTRADA 2026

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 25 questões numeradas de 1 a 25, dispostas da seguinte maneira:
 - a. As questões de número 01 a 08 são relativas aos temas de Saúde Pública
 - b. As questões de 09 a 25 são específicas da área de concentração que você se inscreveu
 2. Confira se o seu caderno de questões contém a quantidade de questões e se essas estão na ordem mencionada na instrução anterior. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente divergência, comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.
 3. Assine o seu nome no espaço próprio do CARTÃO RESPOSTA, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
 4. Não dobre, não amasse nem rasure o CARTÃO RESPOSTA, pois ele não poderá ser substituído.
 5. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas quatro opções de resposta identificadas com as letras A, B, C, D. Apenas uma responde corretamente à questão.
 6. No CARTÃO RESPOSTA preencha todo o espaço compreendido no círculo correspondente à opção escolhida. A marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
 7. O tempo disponível para esta prova é de **duas horas e trinta minutos**.
 8. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
 9. Quando terminar a prova, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO RESPOSTA.
 10. Você poderá deixar o local da prova somente após decorrido uma hora do início da aplicação. Poderá levar seu CADERNO DE QUESTÕES, ao deixar em definitivo a sala de provas após 90 minutos do início da prova.
 11. Você será excluído do exame no caso de:
 - a) prestar, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
 - b) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer participante ou pessoa envolvida no processo de aplicação das provas;
 - c) perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação da prova, incorrendo em comportamento indevido durante a realização do exame;
 - d) se comunicar, durante a prova, com outro participante verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma;
 - e) utilizar qualquer tipo de equipamento eletrônico e de comunicação durante a realização do exame;
 - f) utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento, em benefício próprio ou de terceiros, em qualquer etapa do exame;
 - g) estar trajando boné ou chapéu ou portar arma de fogo;
 - h) utilizar livros, notas ou impressos durante a realização do exame;
 - i) se ausentar da sala levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES antes do prazo estabelecido e / ou o CARTÃO RESPOSTA a qualquer tempo.
-
-

TEMAS DE SAÚDE PÚBLICA

QUESTÕES DE 01 A 08

QUESTÃO 01



Sobre as características das leptospiroses encontradas no Guia de Vigilância em Saúde, marque a alternativa **INCORRETA**.

A) Dentro do gênero *Leptospira*, é possível distinguir três grupos: patogênicos, não patogênicos, e um grupo intermediário, sendo o grupo *Leptospira interrogans* o grupo patogênico.

B) Mais de 300 sorovares já foram identificados, cada um com o(s) seu(s) hospedeiro(s) preferencial(ais), ainda que uma espécie animal possa albergar um ou mais sorovares.

C) No Brasil, os sorovares *Icterohaemorrhagiae* e *Canicola* estão relacionados aos casos mais graves.

D) Os animais infectados podem eliminar a leptospira por meio da urina durante meses, anos ou por toda a vida, segundo a espécie animal e o sorovar envolvido.

QUESTÃO 2

O Brasil é hoje o segundo país no mundo em população de cães e gatos. No entanto, não existem dados oficiais sobre a estimativa do número de animais abandonados, o que compromete a definição da estratégia de combate a essa prática no país. Sobre as técnicas de estimativa de animais em Programas de Manejo Populacional em campi universitários, analise as afirmativas a seguir:

- I. A **contagem direta por busca ativa** envolve o deslocamento em transecto por área/quadrante predeterminado, na intenção de observar e registrar o avistamento de animais e diferenciar suas características físicas dos demais. É feita a fotoidentificação, o georreferenciamento, a distinção sexual e de faixa etária.
- II. O **monitoramento remoto** pode também auxiliar na contabilização de animais pouco avistados, seja pelo comportamento feral ou por habitar áreas com recursos que não motivam o animal à aproximação humana. A estratégia pode ser feita por meio de câmeras *trap* ou por veículo aéreo não tripulado (VANT).
- III. O **levantamento por questionário** com pessoas que interagem com os animais pode ser feito junto aos cuidadores/protetores que interagem com eles, principalmente durante as atividades de alimentação, contato social, entre outras. Porém, considerando-se o perfil de animais em *campi* universitários, a restrição é maior, visto que são animais de vida livre.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- A) I e II.
- B) II e III
- C) I e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 3



Segundo o Guia de Vigilância em Saúde (2024), em relação à notificação de casos suspeitos de arboviroses no Brasil, assinale a **CORRETA**:

- A) É compulsória e deve ocorrer de forma imediata apenas para dengue.
- B) É compulsória para dengue, Zika, chikungunya e febre amarela, entre outros agravos.
- C) É obrigatória apenas em situações de surto ou epidemia.
- D) Só é necessária quando o caso é confirmado laboratorialmente.

QUESTÃO 4

Os acidentes por animais peçonhentos são agravos de notificação compulsória no Brasil. Considerando as informações do Guia de Vigilância Epidemiológica – 7ª edição (2009), assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Os acidentes por serpentes do gênero Bothrops são os mais frequentes no Brasil; todos os casos suspeitos, leves ou graves, devem ser notificados no SINAN, e a gravidade é estratificada por quadro clínico.
- B) O escorpionismo apresenta maior gravidade em crianças e idosos; todos os acidentes, independentemente do estado clínico, devem ser notificados, e a vigilância inclui registro, investigação epidemiológica e ações educativas.
- C) Acidentes por aranhas do gênero Loxosceles podem evoluir com necrose cutânea e hemólise; o uso de soro antiaracnídico é indicado obrigatoriamente para todos os casos, independentemente do tempo de evolução ou da gravidade.
- D) A notificação compulsória e o registro no SINAN permitem mapear áreas de risco, identificar padrões sazonais e orientar estratégias de prevenção e distribuição de soros.

QUESTÃO 05



A esporotricose apresenta diferentes formas clínicas, com características epidemiológicas e patológicas específicas. Considerando o conhecimento atual sobre essa micose subcutânea, é **CORRETO** afirmar que:

- A) A forma cutânea adversa restringe-se a indivíduos imunodeprimidos e caracteriza-se pelo envolvimento dérmico extenso e múltiplo. Está frequentemente relacionada à contaminação ambiental e possui a sinonímia “doença do jardineiro”.
- B) A forma cutânea disseminada pode ocorrer tanto em imunocompetentes quanto em imunossuprimidos; no primeiro caso, é frequentemente relacionada à transmissão zoonótica felina devido a múltiplas inoculações traumáticas.
- C) As manifestações neurológicas da esporotricose são raras, ocorre geralmente em indivíduos imunodeprimidos e apresentam quadro clínico patognomônico que as diferencia da tuberculose meníngea e do abscesso cerebral.
- D) Nos casos de esporotricose pulmonar, o quadro clínico é exuberante, com sintomatologia respiratória intensa e progressiva, sendo pouco frequente a ocorrência de lesões cavitárias detectáveis em exames radiológicos.

QUESTÃO 06



O vírus rábico penetra no organismo, multiplica-se no ponto de inoculação, atinge o sistema nervoso periférico e, posteriormente, o sistema nervoso central. A partir daí, dissemina-se para vários órgãos e glândulas salivares, onde também se replica, sendo eliminado pela saliva das pessoas ou animais enfermos. Sobre o período de incubação do vírus rábico é **CORRETO** afirmar que:

- A) Será mais longo quanto maior for à profundidade da mordedura, da arranhadura, da lambedura ou do contato com a saliva de animais infectados.
- B) Nos cães e nos gatos, a eliminação de vírus pela saliva ocorre de dois a cinco dias antes do início do período de incubação e persiste por toda a evolução da doença.
- C) Está diretamente relacionado à distância entre o local do ferimento e o cérebro e troncos nervosos; concentração de partículas virais inoculadas e cepa viral.
- D) Para mamíferos, o período de incubação é bem semelhante, variando de 1 a 4 meses. Nos caninos domésticos, por exemplo, é de 10 dias.

QUESTÃO 07



Define-se “Caso Confirmado” de Toxoplasmose adquirida durante a gestação quando um “Caso Suspeito” apresenta uma das situações a seguir:

- I. Soroconversão de anticorpos IgG e IgM anti-*Toxoplasma gondii* durante o período gestacional.
- II. Detecção de DNA do *T. gondii* em amostra de líquido amniótico, em tecido placentário, fetal ou de órgãos.
- III. Ser mãe de recém-nascido com toxoplasmose congênita confirmada.
- IV. Ter IgG reagente mais de três meses antes da concepção.

Estão **CORRETAS** apenas as afirmativas:

- A) I e II.
- B) I, II e III.
- C) III e IV.
- D) II, III e IV.

QUESTÃO 08

Nas Américas, a *Leishmania (Leishmania) infantum* é a espécie causadora da leishmaniose visceral (LV) e o cão (*Canis familiaris*) é a principal fonte de infecção para o vetor flebotomíneo em áreas urbanas. Sobre esta importante zoonose, são feitas as afirmações abaixo:

- I. Eutanásia é uma medida de controle e recomendada a todos os cães com sorologia reagente ou exame parasitológico positivo que não sejam submetidos ao tratamento.
- II. O teste imunocromatográfico rápido (TR) é indicado para a triagem de cães e o Ensaio Imunoenzimático (ELISA) para a confirmação dos cães sororreagentes ao TR.
- III. A definição de “Caso canino confirmado” ocorre somente após teste sorológico reagente ou exame parasitológico positivo.
- IV. O uso de coleiras é recomendado apenas aos cães não reagentes em sorologia para leishmaniose visceral.

Estão **CORRETAS** apenas as afirmativas:

- A) I e II.
- B) I, II e III.
- C) III e IV.
- D) II, III e IV.



TEMAS DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO

QUESTÕES DE 9 A 25

QUESTÃO 09



Sobre parto fisiológico em cadelas, assinale a **AFIRMATIVA CORRETA**:

- A) A ordem correta das fases do parto fisiológico da cadela são: delivramento, fase prodrômica, fase de dilatação e fase de expulsão fetal.
- B) Sabe-se que dois a três dias que antecedem ao parto, as cadelas podem apresentar inquietação, isolamento, hiporexia e fazem ninho, comportamentos estes que parecem estar relacionados à elevação da prolactina.
- C) A fase de expulsão se caracteriza pela ruptura apenas da bolsa amniótica e apenas contrações uterinas.
- D) No parto de cadelas, muito raramente os neonatos nascem em apresentação posterior.

QUESTÃO 10



Sobre piometra em cadelas, assinale a **AFIRMATIVA CORRETA**:

- A) A Piometra é uma condição que ocorre no estro, a cadela pode apresentar azotemia pré-renal devido à menor perfusão, desidratação e choque, havendo riscos potenciais à vida.
- B) Hidratação, correção de desequilíbrios eletrolíticos/ácido-base e antibioticoterapia são condutas indicadas no pré-cirúrgico e o prognóstico melhora quando a azotemia é corrigida antes da ovariohisterectomia.
- C) Na ovariohisterectomia de cadelas com piometra, é indicado o uso do “gancho de Snock, que é um instrumental utilizado para exteriorizar o útero.
- D) Nos casos de piometra, a morbidade e a mortalidade não estão relacionadas às alterações metabólicas e disfunção dos órgãos, mas sim apenas ao momento que a ovariohisterectomia é realizada.

QUESTÃO 11



Considerando as afecções prostáticas em cães, assinale a **afirmativa correta**:

- A) A hiperplasia prostática benigna é a afecção prostática mais comum em cães, está relacionada com a idade e ocorre em 95% dos cães a partir dos dois anos de idade.
- B) A próstata aumentada de tamanho/volume pode estar associada à ocorrência de hérnia inguinal.
- C) A orquiectomia causa involução prostática permanente um ano após a cirurgia.
- D) Embora a neoplasia prostática seja uma doença incomum em cães (0,2 a 0,6%) e rara em gatos, sabe-se que ela é a doença prostática de maior ocorrência em cães castrados.

QUESTÃO 12



Considerando as possíveis complicações associadas à ovariectomia de cadelas e gatas, assinale a **AFIRMATIVA CORRETA**:

- A) Hemorragia excessiva pode ocorrer quando a ovariectomia é realizada durante o estro, devido ao predomínio estrogênico.
- B) Tratos fistulosos e granulomas podem ocorrer quando se utiliza qualquer fio cirúrgico absorvível, sendo que as fístulas normalmente estão localizadas na região do flanco.
- C) Dentre as causas de incontinência urinária em cadelas incluem-se baixos níveis de progesterona e $\text{PGF}_{2\alpha}$, granuloma de coto uterino e aderências com bexiga.
- D) A ligadura de ureter levando a hidronefrose pode ocorrer caso a bexiga esteja muito distendida, e o trígono e a junção ureterovesical estejam deslocados caudo-lateralmente.

QUESTÃO 13



Referente à gonadectomia precoce em cães e gatos assinale a **ALTERNATIVA**

CORRETA:

A) A castração precoce em cães e gatos, machos e fêmeas, atrasa o fechamento das placas epifisárias em média de 8 a 9 semanas, resultando no aumento do comprimento ósseo.

B) O risco de tumores mamários em cadelas e gatas castradas antes do primeiro estro é de 0,3%.

C) Cadelas apresentam maior risco de desenvolver incontinência urinária quando a castração é realizada após dois anos de idade.

D) Vulva, pênis e prepúcio persistem com aspecto infantil quando a castração é precoce, diferentemente das glândulas mamárias que não são afetadas.

QUESTÃO 14



Os cálculos renais e uretrais quando presentes em cães podem ser tornar uma urgência cirúrgica, já que podem levar a obstrução das vias urinárias. Com relação aos cálculos ureterais, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) A remoção cirúrgica deve ser considerada quando eles estiverem infectados ou causarem obstrução completa do ureter.
- B) A nefrectomia (juntamente com o ureter) está indicada em rins não funcionais, caso contrário, o rim deve ser preservado.
- C) Após a realização da ureterotomia é necessário a passagem e a fixação de um tubo no ureter, como um do tipo Duplo J, para facilitar a cicatrização do ureter.
- D) Quando os ureterólitos estiverem localizados no terço proximal do ureter, sem dilatação da pelve renal, este deve ser removido por ureterotomia.

QUESTÃO 15



A hérnia perineal é uma patologia observada comumente nos cães, no qual seu tratamento é a herniorrafia. Com relação a essa patologia e seu tratamento, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Quando há a retroflexão da bexiga e aprisionamento visceral, a cirurgia de herniorrafia deve ser realizada em caráter de urgência, após tentativas de redução manual do conteúdo do saco herniário.
- B) Os cães castrados apresentam uma taxa de recidiva cirúrgica 3 vezes maior que os cães não castrados.
- C) A técnica cirúrgica de transposição do músculo obturador interno tem a vantagem de promover menos tensão nas suturas para fechamento do defeito, além de provocar menor deformação do ânus.
- D) São estruturas importantes que estão na região da abordagem cirúrgica os músculos esfíncter uretral externo, músculo elevador do ânus, obturador interno e nervo, artéria e veia pudenda externa.

QUESTÃO 16



O prolapso da glândula da terceira pálpebra é o distúrbio primário mais comum na terceira pálpebra. Com relação a essa patologia e seu tratamento, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O prolapso da glândula pode ser uni ou bilateral, e geralmente ocorre em animais jovens, com menos dos 2 anos de idade.
- B) O tratamento cirúrgico geralmente indicado é reposicionamento da glândula ou sua extirpação.
- C) As técnicas cirúrgicas de ancoramento são as que apresentam menos recidivas quando comparada as técnicas de envelope.
- D) O prolapso da glândula pode ser resultado da fraqueza do tecido conjuntivo entre a porção ventral da terceira pálpebra e os tecidos periorbitários, fazendo com que essa glândula se mova dorsalmente.

QUESTÃO 17



A efusão pericárdica, traumática ou não, muitas vezes requer como tratamento a pericardiectomia de emergência, já que pode promover o tamponamento cardíaco, com consequências danosas a função cardíaca. Com relação a esse procedimento cirúrgico, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) A toracotomia para acesso ao pericárdio deve ser realizada no 7º espaço intercostal esquerdo.
- B) Pode-se realizar a técnica de pericardiectomia subvagal e total, ambas com boa resolução clínica.
- C) Geralmente, após esse procedimento cirúrgico, não há necessidade de se colocar tubo de toracostomia.
- D) O eletrocautério bipolar ou dispositivo de selagem de vasos são úteis para a pericardiectomia, para diminuir a hemorragia intra e pós-operatória.

QUESTÃO 18



Dentre as técnicas de cirurgia reconstrutiva, destacam-se aquelas que utilizam os retalhos de padrão axial, caracterizados pela incorporação de uma artéria e veia cutâneas diretas na base do retalho, sendo fundamental o reconhecimento da anatomia para adequada localização e delimitação do retalho no planejamento cirúrgico. Acerca dos retalhos de padrão axial, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) São baseados no plexo subdérmico, permitindo mobilizações limitadas.
- B) Em geral, apresentam maior mobilidade e comprimento do que retalhos subdermais.
- C) São indicados apenas para uso em membros distais.
- D) Apresentam maior chance de necrose do que os retalhos subdermais

QUESTÃO 19



O retalho axial baseado na artéria temporal superficial é especialmente indicado para reconstrução de defeitos localizados em:

- A) Região mentoniana.
- B) Região proximal do membro torácico.
- C) Região orbitária, infraorbitária ou entre os olhos.
- D) Região torácica lateral.

QUESTÃO 20



Sobre o planejamento dos retalhos subdermais e axiais, qual das seguintes afirmações é **CORRETA**:

- A) Retalhos de avanço são aplicados principalmente nos padrões axiais, não sendo recomendado a excisão dos triângulos de Bürow.
- B) O ângulo de transposição pode variar de 45° a 180° .
- C) Ângulos de transposição maiores devem ser aplicados apenas nos retalhos subdermais e não nos axiais.
- D) O comprimento máximo do retalho é definido pela distância entre o angiossomo e o ponto mais distante da ferida (pivô).

QUESTÃO 21



O linfonodo é frequentemente o primeiro sítio de metástase de neoplasias malignas de origem epitelial. Apesar das controvérsias, a excisão dos linfonodos é indicada nas seguintes situações, **EXCETO**.

- A) Linfonodo com metástase confirmada por citologia, mas apresentando aderência aos tecidos ao redor.
- B) Linfonodo identificado como sentinela em pacientes com neoplasias mamárias ou mastocitoma.
- C) Linfonodo axilar em cadela com neoplasia de 4cm localizada na mama torácica caudal.
- D) Linfonodo traqueobrônquico apresentando aumento de tamanho em paciente com neoplasia pulmonar solitária, ressecável.

QUESTÃO 22



Referente a lesões medulares. Assinale a alternativa **ERRADA**:

A) A doença degenerativa do disco intervertebral é o problema espinhal mais comum em cães, mas um distúrbio clínico relativamente infrequente em gatos.

B) A postura de Schiff–Sherrington é um fenômeno anatômico devido a um trauma toracolombar e não é um indicador prognóstico.

C) Segmentos medulares L4-L6 dão origem às raízes nervosas que compõem a cauda equina, portanto, lesões nesse segmento não comprometem capacidade motora.

D) A síndrome de Horner pode ocorrer em lesões medulares cervicais e cervicotorácicas.

QUESTÃO 23



A instabilidade atlantoaxial é uma condição que comumente gera quadros de subluxação ou luxação dessa articulação. Sendo assim, assinale a alternativa

ERRADA:

- A) A patogênese da doença geralmente envolve malformação congênita do dente (hipoplasia ou aplasia), tornando a articulação instável e causando a subluxação.
- B) O tratamento conservativo para subluxações atlantoaxiais deve ser realizado com bandagem desde que a mesma tenha extensão cranial posicionada sob a mandíbula e a extensão caudal cobrindo a região torácica
- C) As taxas de sucesso cirúrgico para correção da instabilidade atlantoaxial variam na literatura de aproximadamente 60 a 95%.
- D) A instabilidade atlantoaxial favorece além de luxação ou subluxação dorsal do eixo, a protusão do disco intervertebral com consequente compressão da medula espinhal.

QUESTÃO 24



Sobre luxação de patela, marque a resposta **ERRADA**:

A) As deformidades tibiais descritas com a luxação patelar medial incluem o deslocamento medial da tuberosidade da tíbia, o arqueamento medial (deformidade vara) da tíbia proximal e a torção lateral da tíbia distal.

B) Os cães com luxação patelar medial apresentam um desenvolvimento anormal do sulco troclear. O grau de anormalidade varia de uma tróclea quase normal até a ausência de sulco troclear.

C) Na luxação patelar de grau III, a patela pode ser deslocada manualmente com uma pressão lateral ou pode luxar com a flexão da articulação do joelho e permanece luxada até que seja reduzida pelo examinador ou seja espontaneamente reduzida quando o animal se estender e desfizer a rotação de sua tíbia.

D) A cirurgia é indicada para pacientes sintomáticos imaturos ou jovens adultos, pois a luxação patelar intermitente pode desgastar, prematuramente, a cartilagem articular da patela.

QUESTÃO 25



Marque a alternativa **CORRETA**:

- A) A aplicação de uma tala externa deve ser considerada um procedimento simples embora complicações graves possam ocorrer.
- B) As bandagens Robert Jones estendem-se da ponta dos dedos até o fêmur no terço médio ou úmero no terço médio, e auxiliam na eliminação de espaço morto após a cirurgia.
- C) As bandagens de Velpeau envolvem o tórax e o membro acometido, e são utilizadas geralmente como talas temporárias para imobilizar fraturas de úmero e fêmur ou como estabilização adjunta após uma fixação interna.
- D) As bandagens de Ehmer previnem o suporte do peso sobre o membro torácico. O uso mais comum para esse tipo de bandagem é o apoio de reduções de luxação da articulação escápulo-umeral, aberta ou fechada.



RASCUNHO DO GABARITO

ÁREA: Clínica Cirúrgica em Animais de Companhia

Nome: _____

USE SOMENTE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA PARA MARCAR SUA
RESPOSTA

PREENCHA CORRETAMENTE COMO INDICADO:



Saúde Pública				
1	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Área de concentração específica									
9	A	B	C	D	17	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	A	B	C	D	18	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	A	B	C	D	19	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	A	B	C	D	20	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13	A	B	C	D	21	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14	A	B	C	D	22	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15	A	B	C	D	23	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16	A	B	C	D	24	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					25	A	B	C	D
						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

