

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA INTEGRADA EM MEDICINA VETERINÁRIA

ESCOLA DE VETERINÁRIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

ÁREA: Clínica Médica de Pequenos Animais

ENTRADA 2026

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 25 questões numeradas de 1 a 25, dispostas da seguinte maneira:
 - a. As questões de número 01 a 08 são relativas aos temas de Saúde Pública
 - b. As questões de 09 a 25 são específicas da área de concentração que você se inscreveu
 2. Confira se o seu caderno de questões contém a quantidade de questões e se essas estão na ordem mencionada na instrução anterior. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente divergência, comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.
 3. Assine o seu nome no espaço próprio do CARTÃO RESPOSTA, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
 4. Não dobre, não amasse nem rasure o CARTÃO RESPOSTA, pois ele não poderá ser substituído.
 5. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas quatro opções de resposta identificadas com as letras A, B, C, D. Apenas uma responde corretamente à questão.
 6. No CARTÃO RESPOSTA preencha todo o espaço compreendido no círculo correspondente à opção escolhida. A marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
 7. O tempo disponível para esta prova é de **duas horas e trinta minutos**.
 8. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
 9. Quando terminar a prova, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO RESPOSTA.
 10. Você poderá deixar o local da prova somente após decorrido uma hora do início da aplicação. Poderá levar seu CADERNO DE QUESTÕES, ao deixar em definitivo a sala de provas após 90 minutos do início da prova.
 11. Você será excluído do exame no caso de:
 - a) prestar, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
 - b) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer participante ou pessoa envolvida no processo de aplicação das provas;
 - c) perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação da prova, incorrendo em comportamento indevido durante a realização do exame;
 - d) se comunicar, durante a prova, com outro participante verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma;
 - e) utilizar qualquer tipo de equipamento eletrônico e de comunicação durante a realização do exame;
 - f) utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento, em benefício próprio ou de terceiros, em qualquer etapa do exame;
 - g) estar trajando boné ou chapéu ou portar arma de fogo;
 - h) utilizar livros, notas ou impressos durante a realização do exame;
 - i) se ausentar da sala levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES antes do prazo estabelecido e / ou o CARTÃO RESPOSTA a qualquer tempo.
-
-



TEMAS DE SAÚDE PÚBLICA

QUESTÕES DE 01 A 08

QUESTÃO 01



Sobre as características das leptospiroses encontradas no Guia de Vigilância em Saúde, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) Dentro do gênero *Leptospira*, é possível distinguir três grupos: patogênicos, não patogênicos, e um grupo intermediário, sendo o grupo *Leptospira interrogans* o grupo patogênico.
- B) Mais de 300 sorovares já foram identificados, cada um com o(s) seu(s) hospedeiro(s) preferencial(ais), ainda que uma espécie animal possa albergar um ou mais sorovares.
- C) No Brasil, os sorovares *Icterohaemorrhagiae* e *Canicola* estão relacionados aos casos mais graves.
- D) Os animais infectados podem eliminar a leptospira por meio da urina durante meses, anos ou por toda a vida, segundo a espécie animal e o sorovar envolvido.

QUESTÃO 2

O Brasil é hoje o segundo país no mundo em população de cães e gatos. No entanto, não existem dados oficiais sobre a estimativa do número de animais abandonados, o que compromete a definição da estratégia de combate a essa prática no país. Sobre as técnicas de estimativa de animais em Programas de Manejo Populacional em campi universitários, analise as afirmativas a seguir:

- I. A **contagem direta por busca ativa** envolve o deslocamento em transecto por área/quadrante predeterminado, na intenção de observar e registrar o avistamento de animais e diferenciar suas características físicas dos demais. É feita a fotoidentificação, o georreferenciamento, a distinção sexual e de faixa etária.
- II. O **monitoramento remoto** pode também auxiliar na contabilização de animais pouco avistados, seja pelo comportamento feral ou por habitar áreas com recursos que não motivam o animal à aproximação humana. A estratégia pode ser feita por meio de câmeras *trap* ou por veículo aéreo não tripulado (VANT).
- III. O **levantamento por questionário** com pessoas que interagem com os animais pode ser feito junto aos cuidadores/protetores que interagem com eles, principalmente durante as atividades de alimentação, contato social, entre outras. Porém, considerando-se o perfil de animais em *campi* universitários, a restrição é maior, visto que são animais de vida livre.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- A) I e II.
- B) II e III
- C) I e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 3

Segundo o Guia de Vigilância em Saúde (2024), em relação à notificação de casos suspeitos de arboviroses no Brasil, assinale a **CORRETA**:

- A) É compulsória e deve ocorrer de forma imediata apenas para dengue.
- B) É compulsória para dengue, Zika, chikungunya e febre amarela, entre outros agravos.
- C) É obrigatória apenas em situações de surto ou epidemia.
- D) Só é necessária quando o caso é confirmado laboratorialmente.

QUESTÃO 4

Os acidentes por animais peçonhentos são agravos de notificação compulsória no Brasil. Considerando as informações do Guia de Vigilância Epidemiológica – 7ª edição (2009), assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Os acidentes por serpentes do gênero Bothrops são os mais frequentes no Brasil; todos os casos suspeitos, leves ou graves, devem ser notificados no SINAN, e a gravidade é estratificada por quadro clínico.
- B) O escorpionismo apresenta maior gravidade em crianças e idosos; todos os acidentes, independentemente do estado clínico, devem ser notificados, e a vigilância inclui registro, investigação epidemiológica e ações educativas.
- C) Acidentes por aranhas do gênero Loxosceles podem evoluir com necrose cutânea e hemólise; o uso de soro antiaracnídico é indicado obrigatoriamente para todos os casos, independentemente do tempo de evolução ou da gravidade.
- D) A notificação compulsória e o registro no SINAN permitem mapear áreas de risco, identificar padrões sazonais e orientar estratégias de prevenção e distribuição de soros.

QUESTÃO 05



A esporotricose apresenta diferentes formas clínicas, com características epidemiológicas e patológicas específicas. Considerando o conhecimento atual sobre essa micose subcutânea, é **CORRETO** afirmar que:

- A) A forma cutânea adversa restringe-se a indivíduos imunodeprimidos e caracteriza-se pelo envolvimento dérmico extenso e múltiplo. Está frequentemente relacionada à contaminação ambiental e possui a sinonímia “doença do jardineiro”.
- B) A forma cutânea disseminada pode ocorrer tanto em imunocompetentes quanto em imunossuprimidos; no primeiro caso, é frequentemente relacionada à transmissão zoonótica felina devido a múltiplas inoculações traumáticas.
- C) As manifestações neurológicas da esporotricose são raras, ocorre geralmente em indivíduos imunodeprimidos e apresentam quadro clínico patognomônico que as diferencia da tuberculose meníngea e do abscesso cerebral.
- D) Nos casos de esporotricose pulmonar, o quadro clínico é exuberante, com sintomatologia respiratória intensa e progressiva, sendo pouco frequente a ocorrência de lesões cavitárias detectáveis em exames radiológicos.

QUESTÃO 06



O vírus rábico penetra no organismo, multiplica-se no ponto de inoculação, atinge o sistema nervoso periférico e, posteriormente, o sistema nervoso central. A partir daí, dissemina-se para vários órgãos e glândulas salivares, onde também se replica, sendo eliminado pela saliva das pessoas ou animais enfermos. Sobre o período de incubação do vírus rábico é **CORRETO** afirmar que:

- A) Será mais longo quanto maior for à profundidade da mordedura, da arranhadura, da lambedura ou do contato com a saliva de animais infectados.
- B) Nos cães e nos gatos, a eliminação de vírus pela saliva ocorre de dois a cinco dias antes do início do período de incubação e persiste por toda a evolução da doença.
- C) Está diretamente relacionado à distância entre o local do ferimento e o cérebro e troncos nervosos; concentração de partículas virais inoculadas e cepa viral.
- D) Para mamíferos, o período de incubação é bem semelhante, variando de 1 a 4 meses. Nos caninos domésticos, por exemplo, é de 10 dias.

QUESTÃO 07



Define-se “Caso Confirmado” de Toxoplasmose adquirida durante a gestação quando um “Caso Suspeito” apresenta uma das situações a seguir:

- I. Soroconversão de anticorpos IgG e IgM anti-*Toxoplasma gondii* durante o período gestacional.
- II. Detecção de DNA do *T. gondii* em amostra de líquido amniótico, em tecido placentário, fetal ou de órgãos.
- III. Ser mãe de recém-nascido com toxoplasmose congênita confirmada.
- IV. Ter IgG reagente mais de três meses antes da concepção.

Estão **CORRETAS** apenas as afirmativas:

- A) I e II.
- B) I, II e III.
- C) III e IV.
- D) II, III e IV.

QUESTÃO 08



Nas Américas, a *Leishmania (Leishmania) infantum* é a espécie causadora da leishmaniose visceral (LV) e o cão (*Canis familiaris*) é a principal fonte de infecção para o vetor flebotomíneo em áreas urbanas. Sobre esta importante zoonose, são feitas as afirmações abaixo:

- I. Eutanásia é uma medida de controle e recomendada a todos os cães com sorologia reagente ou exame parasitológico positivo que não sejam submetidos ao tratamento.
- II. O teste imunocromatográfico rápido (TR) é indicado para a triagem de cães e o Ensaio Imunoenzimático (ELISA) para a confirmação dos cães sororreagentes ao TR.
- III. A definição de “Caso canino confirmado” ocorre somente após teste sorológico reagente ou exame parasitológico positivo.
- IV. O uso de coleiras é recomendado apenas aos cães não reagentes em sorologia para leishmaniose visceral.

Estão **CORRETAS** apenas as afirmativas:

- A) I e II.
- B) I, II e III.
- C) III e IV.
- D) II, III e IV.



TEMAS DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO

QUESTÕES DE 9 A 25

QUESTÃO 09



Em relação ao tratamento da insuficiência cardíaca congestiva (ICC) aguda em pequenos animais, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) O uso prolongado de oxigênio em concentrações superiores a 70% é seguro e indicado para manter uma boa oxigenação pulmonar em todos os casos.
- B) A hidralazina é recomendada como vasodilatador de primeira escolha em casos de ICC, inclusive quando há disfunção diastólica.
- C) A administração intravenosa de furosemida promove diurese rápida, com início de ação em cerca de 5 minutos e pico de efeito em 30 minutos.
- D) A dopamina, mesmo em altas doses, é segura por causar apenas efeitos leves sobre a frequência cardíaca e o consumo de oxigênio.

QUESTÃO 10



Sobre o ducto arterioso persistente (PDA) em cães, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) A maioria dos casos de PDA apresenta fluxo da artéria pulmonar para a aorta, caracterizando um *shunt* da direita para a esquerda.
- B) O achado clínico típico do PDA com *shunt* da esquerda para a direita inclui sopro sistólico e pulsos arteriais hipocinéticos.
- C) O PDA com fluxo da esquerda para a direita pode causar sobrecarga de volume no átrio direito, no ventrículo direito e na circulação pulmonar.
- D) O fechamento do PDA é contraindicado em casos de *shunt* da direita para a esquerda, pois pode resultar em falência aguda do ventrículo direito.

QUESTÃO 11



Sobre o manejo clínico da Degeneração Mixomatosa da Valva Mitral (DMVM) em cães, assinale a alternativa correta:

- A) Broncodilatadores podem ser usados em casos suspeitos de broncoespasmo causado por edema pulmonar grave, mas sua eficácia é incerta, seu uso rotineiro não é recomendado e há risco de arritmias.
- B) Na fase B1 da DMVM, o uso de pimobendan é indicado para prevenir o remodelamento cardíaco.
- C) A administração de pimobendan e furosemida em cães com CMVD em estágio B2 está associada ao atraso na progressão para o estágio C e ao aumento da sobrevida.
- D) Após o aparecimento de Insuficiência Cardíaca Congestiva (estágio C), o uso de digoxina é sempre preferido ao pimobendan devido à menor toxicidade e maior eficácia.

QUESTÃO 12



Com relação a traqueobronquite infecciosa canina, assinale a alternativa

CORRETA:

- A) O uso de glicocorticoides é recomendado nos casos não complicados da doença, pois reduz a inflamação brônquica e acelera a recuperação clínica.
- B) A vacinação contra *Bordetella bronchiseptica* elimina completamente o risco de infecção e de transmissão entre cães.
- C) A maioria dos casos de traqueobronquite infecciosa canina é autolimitada e não requer antibioticoterapia, exceto quando há sinais sistêmicos como febre, letargia e secreção mucopurulenta.
- D) Um resultado negativo no teste de PCR descarta com segurança a presença de agentes infecciosos envolvidos na enfermidade.

QUESTÃO 13



A diarreia é uma importante manifestação clínica dos distúrbios gastrointestinais. Sobre este assunto, considere as afirmativas a seguir:

- I. A diarreia do intestino delgado pode ser acompanhada de perda de peso, volume fecal reduzido e, em alguns casos, polifagia.
- II. Animais com diarreia crônica devem ser examinados quanto à presença de parasitas. Os testes rápidos “*snap*” de imunoenensaio enzimático (ELISA) para *Giardia* realizados no consultório são mais sensíveis que o exame fecal e apresentam excelentes valores preditivos negativos.
- III. Linfangiectasia, linfoma do trato digestivo, doença inflamatória intestinal e hemorragias do trato digestivo são potenciais causas de enteropatia com perda de proteína em cães.

Assinale a alternativa que indica as afirmações **CORRETAS**:

- A) Apenas I.
- B) I e III.
- C) II e III.
- D) Apenas III.

QUESTÃO 14



Sobre o diabetes mellitus em cães e gatos, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) A insulina glargina é a primeira escolha para o tratamento inicial do cão diabético, devido à sua ação rápida e curta duração.
- B) A insulina NPH é uma insulina de origem porcina e deve ser sempre agitada vigorosamente antes da administração para evitar inativação.
- C) O diabetes tipo 1 predomina em gatos e é caracterizado por resistência à insulina e células β disfuncionais.
- D) Gatos com diabetes tipo 2 podem entrar em remissão clínica, especialmente após o controle da resistência à insulina e da hiperglicemia. Dietas ricas em proteínas e pobres em carboidratos auxiliam na reversão.

QUESTÃO 15



Sobre os desequilíbrios eletrolíticos, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) A correção rápida da hiponatremia deve ser preconizada, não havendo riscos de complicações.
- B) Insulina com dextrose é usada no tratamento da hipercalemia apenas em casos sintomáticos ou graves ($K^+ > 7$ mEq/L).
- C) A hipocalcemia é frequentemente associada à falência na excreção urinária de potássio, como ocorre em casos de obstrução uretral ou hipoadrenocorticismo.
- D) A suplementação de potássio por via intravenosa pode ser feita em qualquer taxa, desde que o animal esteja hidratado, pois o excesso é rapidamente eliminado pelos rins.

QUESTÃO 16



Sobre as micoses nasais, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) *Cryptococcus neoformans* infecta frequentemente cães, geralmente causando sinais respiratórios graves como tosse e dispneia.
- B) *Aspergillus fumigatus* é um habitante normal da cavidade nasal de muitos animais. Em alguns cães e, raramente, em gatos, torna-se um patógeno.
- C) A presença de placas fúngicas na rinoscopia descarta a necessidade de cultura ou citologia para confirmar o diagnóstico de aspergilose.
- D) Sinais altamente sugestivos de aspergilose incluem sensibilidade à palpação da face, depigmentação e úlceras nas narinas externas, tosse e dispneia expiratória

QUESTÃO 17



São causas potenciais de paralisia de laringe, **EXCETO**:

- A) Trauma envolvendo a região ventral do pescoço.
- B) Hipotireoidismo.
- C) Colapso de traqueia.
- D) Miastenia grave.

QUESTÃO 18



Sobre os aspectos fisiopatológicos do hiperparatireoidismo secundário, analise as seguintes afirmações:

- I. A retenção de fósforo decorrente da insuficiência renal estimula tanto o aumento direto de PTH quanto a produção de fosfatona (FGF-23), que reduz a ativação de vitamina D no rim.
- II. Tanto no hiperparatireoidismo renal quanto no nutricional, ocorre hiperplasia difusa das glândulas paratireoides, independentemente do estímulo ser homogêneo entre todas as glândulas.
- III. O produto cálcio \times fósforo se mantido acima de 50 protege o rim, evitando nefrocalcinose em pacientes com hiperparatireoidismo secundário.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Apenas I.
- B) I e II.
- C) I, II e III.
- D) Todas estão corretas.

QUESTÃO 19



Sobre o diagnóstico de vômito agudo e crônico em cães e gatos, analise as afirmações a seguir:

- I. Animais com vômito agudo sem hematêmese devem inicialmente ser avaliados para causas óbvias, como ingestão de corpo estranho ou intoxicação, e pode-se tentar tratamento sintomático por 1 a 2 dias.
- II. O exame de fezes é indicado principalmente para descartar parasitose, que pode ser causa comum tanto de vômito quanto de diarreia.
- III. A endoscopia digestiva alta é recomendada na investigação do vômito crônico, pois permite biópsias que podem revelar causas gastrointestinais mesmo se a mucosa parecer normal.

Assinale a alternativa que contém apenas afirmativas **CORRETAS**:

- A) Apenas I.
- B) I e II.
- C) II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 20



Sobre a colangite neutrofílica em gatos, analise as afirmativas:

- I. A colangite neutrofílica é causada predominantemente por infecção bacteriana ascendente, sendo *Escherichia coli* o organismo mais comumente isolado.
- II. O diagnóstico definitivo pode ser realizado com base apenas em exames clínicos, laboratoriais e ultrassonografia, sem necessidade de cultura de bile ou citologia.
- III. O tratamento inicial inclui antibióticos baseados em cultura e sensibilidade, podendo ser necessário internamento para imunoterapia nos casos graves.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Apenas I.
- B) I e III.
- C) II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 21



Gatos são animais caçadores e frequentemente ingerem lagartixas. Acerca da infecção por platelmintos hepáticos (trematódeos) em gatos:

- I. Essa parasitose é causada por ingestão de hospedeiros intermediários, como caramujos e pequenos répteis, levando à migração dos parasitas para os ductos biliares.
- II. O diagnóstico consiste em encontrar ovos em fezes ou em aspirados de bile, sendo o segundo método mais confiável, principalmente em casos de obstrução biliar.
- III. O tratamento com praziquantel é o padrão e geralmente promove cura completa sem complicações.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 22



As ureterolitíases são bastante comuns em gatos e oferecem riscos aos pacientes, incluindo agravamento da função renal e obstrução completa, cursando com síndrome urêmica grave. Sobre a ureterolitíase em gatos, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) A ultrassonografia possui sensibilidade superior à radiografia simples e é suficiente para identificar o ureter acometido e o grau de hidronefrose.
- B) A terapia médica é eficaz para o tratamento de cálculos de oxalato de cálcio, promovendo dissolução e eliminação rápida.
- C) O manejo clínico deve envolver avaliação contínua dos sinais clínicos e da função renal, com monitoramento seriado de creatinina, potássio e exames de imagem.
- D) O uso de antagonistas alfa-adrenérgicos como a tamsulosina é contraindicado devido à ausência de eficácia clínica comprovada.

QUESTÃO 23



Sobre o diagnóstico da urolitíase em cães e gatos, quais afirmativas estão **CORRETAS**?

I. Os urolitos de oxalato de cálcio e estruvita geralmente são radiopacos e podem ser identificados em radiografias simples.

II. A ultrassonografia é altamente eficaz para visualizar os cálculos uretrais em cães machos.

III. Estudos contrastados ou ultrassonografia são frequentemente necessários para detectar cálculos de cistina e urato devido à sua baixa radiopacidade.

Opções:

A) Apenas I

B) I e III

C) II e III

D) I, II e III

QUESTÃO 24

Animais idosos costumam apresentar doenças que causam polifagia e perda de peso. Em relação à avaliação nutricional em pacientes com polifagia e perda de peso, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) O cálculo do requerimento energético de manutenção (REM) é fixo para todas as raças independente da idade e atividade.
- B) A fórmula do requerimento energético de repouso (REM) adapta-se ao peso metabólico do animal usando a expressão $70 \times \text{peso}^{0,75}$.
- C) A avaliação do consumo calórico diário do animal nunca é importante na prática clínica.
- D) Distinguir entre consumo calórico abaixo ou acima de 50% do MER não influencia o diagnóstico diferencial.

QUESTÃO 25

Atualmente, a obesidade em cães e gatos é cada vez mais comum. Sobre a taxa ideal de perda de peso em programas de emagrecimento para cães e gatos, qual a alternativa **CORRETA**?

- A) Para gatos, perder 10% do peso corporal semanalmente é seguro e eficaz.
- B) O monitoramento do peso não necessita ser tão rigoroso, podendo ser realizado em uma avaliação bianual.
- C) A perda de peso deve ser rápida para melhorar a adesão do proprietário ao tratamento.
- D) Perda de peso de 1-2% do peso corporal por semana é recomendada para cães, e 0,5-2% para gatos, para minimizar efeitos colaterais.



RASCUNHO DO GABARITO

Área: Clínica Médica de Pequenos Animais

Nome: _____

USE SOMENTE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA PARA MARCAR SUA
RESPOSTA

PREENCHA CORRETAMENTE COMO INDICADO: ●

Saúde Pública				
1	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Área de concentração específica									
9	A	B	C	D	17	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	A	B	C	D	18	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	A	B	C	D	19	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	A	B	C	D	20	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13	A	B	C	D	21	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14	A	B	C	D	22	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15	A	B	C	D	23	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16	A	B	C	D	24	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					25	A	B	C	D
						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



